

Государственное общеобразовательное учреждение
Ярославской области «Лицей № 86»

Региональная конференция по научно-техническому творчеству
школьников «Лабиринты науки»

**Комплексная оценка экологического состояния парка «Нефтяник» города
Ярославля**

Секция: экология

Автор:

Зунтов Иван Павлович,
ученик 10 «Ф» класса
ГООУ ЯО «Лицей № 86»

Научные руководители:

Озерова Ольга Николаевна,
учитель биологии
ГООУ ЯО «Лицей № 86»,
Тимрот Сергей Дмитриевич,
кандидат тех. наук,
доцент ЯГТУ

Ярославль

2022

Оглавление

Введение.....	3
1. Асимметрия листьев берёзы как индикатор загрязнённости воздушной среды.....	5
2. Определение фитотоксичности почвы.....	7
3. Определение содержания металлов методом РФА.....	9
Заключение.....	10
Список литературы.....	12
Приложение 1.....	14
Приложение 2.....	15
Приложение 3.....	18
Приложение 4.....	19
Приложение 5.....	20

Введение

Парк – искусственная экосистема, выполняющая не только декоративное и рекреационное значение, но и важную санитарную роль. Однако имеющее место быть в черте города загрязнение атмосферы, почвы, грунтовых вод сильно сказывается на состоянии растительного сообщества.

В настоящее время огромное влияние на окружающую среду оказывает усиливающаяся техногенная нагрузка. За несколько тысячелетий своего развития человек превратился в огромную геологическую силу, воздействующую на облик и энергетику планеты. Добывая и используя различные полезные ископаемые, человек нарушает целые биологические системы, вмешивается в круговорот веществ и энергии в биосфере, главным образом, вовлекая в него несвойственные ранее или концентрированные до опасных уровней неспецифичные, но участвовавшие в биосферном круговороте вещества.

Будучи сконцентрированными, в результате хозяйственной деятельности человека, многие неспецифичные для биологических систем вещества стали высокотоксичными для живых организмов и самого человека (Химические элементы..., 1982).

Один из наиболее опасных загрязнителей окружающей среды – тяжелые металлы (ТМ) не только добываются человеком в чистом виде, они являются сопутствующими элементами многих используемых веществ и материалов.

Основные источники поступления ТМ в не загрязненные почвы: карьеры и шахты при добыче полиметаллических руд, металлургические предприятия; электростанции, сжигающие уголь; автотранспорт; химические средства защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей (Добровольский, 1988).

Известно, что влияние газопылевых выбросов городских предприятий распространяется на расстояние 50 км и более от городской черты (Алексеев, 1990). При этом необходимо учитывать, что тяжелые металлы могут усваиваться

растениями не только из почвы, но и прямо из атмосферы (кадмий, свинец и др.) (Минеев, 1990), что создает большую опасность накопления токсичных веществ в растениях [1].

Для контроля за состоянием окружающей среды, кроме классических и инструментальных методов анализа, все шире используются экспресс-тест-методы, позволяющие достаточно точно и быстро отделить неблагоприятные в экологическом состоянии почвы разных территорий.

Цель: изучить экологическое состояние парка «Нефтяник».

Задачи:

1. Провести оценку загрязнения атмосферного воздуха по флуктуирующей асимметрии листьев берёзы в районе парка.
2. Определить степень фитотоксичности почвы.
3. Измерить pH почвенного раствора, влажность почвы, а также содержание органических веществ в ней (см. Приложение 4).
4. Определить содержание различных металлов в почве парка (см. Приложение 5).
5. Провести анализ дождевой воды (см. Приложение 4).

Объект: экосистема парка «Нефтяник» г. Ярославля.

Предмет: состояние абиотических компонентов данной экосистемы.

Гипотеза: исходя из высокого уровня действующей антропогенной нагрузки, парк «Нефтяник» имеет неблагоприятное экологическое состояние.

1. Асимметрия листьев берёзы как индикатор загрязнённости воздушной среды

Растения – чувствительный объект, позволяющий оценивать весь комплекс воздействий, характерный для данной территории в целом, поскольку они ассимилируют вещества и подвержены прямому воздействию одновременно из двух сред: из почвы и из воздуха. В связи с тем, что растения ведут прикрепленный образ жизни, состояние их организма отражает состояние конкретного локального местообитания. Удобство использования растений заключается в доступности и простоте сбора материала для исследования [2].

Объект исследования: Берёза повислая (в качестве контроля, для сравнения, измерения были проведены и в экологически чистом районе Ярославской области – в деревне Ямищи).

Предмет исследования: флуктуирующая асимметрия листьев.

Флуктуирующей асимметрией называют небольшие ненаправленные (случайные) отклонения от двусторонней симметрии у организмов или их частей (например, листьев берёзы (*Betula pendula* Roth.)). Величину флуктуирующей асимметрии у разных видов организмов используют как индикатор состояния среды, степени антропогенного загрязнения.

Описание методики определения флуктуирующей асимметрии представлено в Приложении 1.

Результаты измерений, проведённые в июне-июле 2022 г., представлены в таблицах 2 и 3 (см. Приложение 2).

Значение стабильности флуктуирующей асимметрии у Берёзы повислой в парке «Нефтяник» равняется 0,067231513, а в деревне Ямищи – 0,033861668.

Уровень атмосферного загрязнения по результатам всех измерений определяется в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Уровень атмосферного загрязнения по значению стабильности флуктуирующей асимметрии у Берёзы повислой

Балл	Величина показателя стабильности развития	Шкала
I	$<0,040$	Условная норма
II	$0,040 - 0,044$	Слабое влияние неблагоприятных факторов
III	$0,045 - 0,049$	Загрязненные районы
IV	$0,050 - 0,054$	Загрязненные районы
V	$>0,054$	Критическое значение

Вывод: исходя из величины показателя стабильности развития у Берёзы повислой видно, что уровень атмосферного загрязнения в парке «Нефтяник» имеет критическое значение ($> 0,054$). Тогда, как этот же показатель в деревне соответствует условной норме.

2. Определение фитотоксичности почвы

Для экспресс диагностики состояния и хозяйственной пригодности почв и её продуктивности широко используют ряд простых диагностических показателей, которые позволяют быстро оценить токсические свойства почвы (Методы почвенной микробиологии..., 1991, Вальков, 1986). Так, разработаны методы определения общей фито-токсичности почв по реакции растений на ранних стадиях онтогенеза (корня, проростка), и рекомендованы наиболее чувствительные к загрязнению тест-растения: кресс-салат, салат-латук и др.

Методом почвенных пластинок успешно выявляется фито-токсичность почв, находящихся в условиях промышленного загрязнения (Евдокимова и др., 1984).

Анализ проводили в трёхкратной повторности, в качестве тест-растения был выбран кресс-салат как чувствительный биотест техногенного загрязнения почв [1].

Фитотоксичность рассчитывается по формуле: $\Phi = (\text{длина ростка на контроле} - \text{длина на экспериментальном участке}) \times 100 / \text{длина ростка на контроле}$.

Оценка фито-токсичности была проведена по четырём группам:

1. < 20 – фито-токсичность не проявляется;
2. $20 - 40$ – слабая фито-токсичность;
3. $40 - 60$ – средняя фито-токсичность;
4. > 60 – сильная фито-токсичность.

Объект исследования: образцы почвы парка «Нефтяник» (в качестве контроля, для сравнения, были отобраны образцы почвы в экологически чистом районе Ярославской области – в деревне Ямищи).

Предмет исследования: фитотоксичность почвы парка «Нефтяник».

Описание методики – в Приложении 3.

Результаты исследования представлены в таблицах 4, 5.

Таблица 4. Проявление фитотоксичности (%) по интенсивности нарастания корешков кресс-салата (среднее из 3-х повторностей)

Срок определения, дни	Контроль (поле без загрязнений)	Парк «Нефтяник»	
	длина корешка, мм	длина корешка, мм	Фито- токсичность, %
3	33.5	16.0	52,2
6	34.8	15.6	55,1
9	37.9	18.2	51,9
Среднее			53,1

Вывод: по интенсивности нарастания корешков семян кресс-салата почва в парке «Нефтяник» обладает средней фитотоксичностью.

Таблица 5. Проявление фитотоксичности (%) по интенсивности нарастания проростков кресс-салата (среднее из 3-х повторностей)

Срок определения, дни	Контроль (поле без загрязнений)	Парк «Нефтяник»	
	длина проростка, мм	длина проростка, мм	Фито- токсичность, %
3	2.4	1.3	46
6	3.7	1.9	49
9	5.2	2.5	52
Среднее			49

Вывод: по интенсивности нарастания проростков кресс-салата почва в парке «Нефтяник» обладает средней фитотоксичностью.

3. Определение содержания металлов методом РФА

На следующем этапе образцы минеральной части почвы были исследованы методом рентгенофлуоресцентного анализа. Метод рентгенофлуоресцентного анализа основан на зависимости интенсивности рентгеновской флуоресценции от концентрации элемента в образце. При облучении образца мощным потоком излучения рентгеновской трубки возникает характеристическое флуоресцентное излучение атомов, которое пропорционально их концентрации в образце.

В работе был использован рентгенофлуоресцентный спектрометр EDX6000B с кремневым детектором SDD. Для определения количественного состава использовалась калибровочная кривая.

Полученные данные представлены в таблице 6, рис.2 и в Приложении 5.

Таблица 6. Металлы, входящие в состав почвенных образцов.

Место	Ni	Mn	Cu	Fe
Парк	0,0619786%	0,1138383%	0,0091028%	2,4671272%
Деревня	0,0025004%	0,0670979%	0,0044404%	2,0186442%




Рис.2. Сравнительное содержание некоторых металлов в образцах исследуемых почв

Вывод: в образце почвы парка «Нефтяник» по сравнению с деревенской значительно выше содержание таких металлов как никель, марганец, медь и железо.

Заключение

Исходя из полученных результатов исследования, мы видим, что выдвинутая нами гипотеза подтвердилась.

1. По значению стабильности флуктуирующей симметрии у Берёзы повислой мы можем сделать вывод, что степень загрязнения окружающей среды в парке высокая. Причём асимметрия листьев у растений может быть обусловлена не только загрязнением атмосферного воздуха, но и почвы.

2. Определение токсичности почвенных образцов показало наличие средней фитотоксичности.

3. Обнаружение высокого содержания некоторых металлов, в том числе тяжёлых, также подтверждает загрязнённость почвенной среды.

4. В составе дождевой воды также имеются существенные отличия по таким показателям, как: водородный показатель (рН), жёсткость воды, содержание хлорид-ионов (Cl⁻), электропроводность (см. Приложение 4).

Основным выводом представленной работы является обоснование возможности использования метода фито-индикации для оценки загрязнённости и токсичности почв, определённых городских территорий. Используя предложенный метод, можно достаточно оперативно, доступно в техническом отношении и с минимумом затрат дать объективную оценку комплексного экологического состояния обследуемых территорий окружающей среды.

Проведение данных работ необходимо в связи с нарастающей техногенной нагрузкой и ограниченностью природных возможностей самой почвы к самоочищению, из-за усиливающегося насыщения её токсичными веществами.

Представленная работа будет продолжена с целью разработки карты проявления негативных экологических ситуаций на территории города Ярославля и выявления наиболее неблагоприятных зон, где требуется применение комплекса мероприятий по детоксикации почв и оздоровления

общей экологической обстановки, в том числе расширение объектов для исследования (парки Краснопереконского района).

Полученные данные могут быть использованы в качестве оценочного материала органами административного управления районов города, а также городской администрации города Ярославля.

Список литературы

1. Максимова Нина Борисовна, Максимова Нина Борисовна, Морковкин Геннадий Геннадьевич, Лаврентьева А. Оценка токсичности и загрязненности почв методом фитоиндикации // Вестник АГАУ. 2003. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-toksichnosti-i-zagryaznennosti-pochv-metodom-fitoindikatsii> (дата обращения: 11.11.2022).
2. Шайхутдинова, А. А. Ш17 Атмосфера промышленного предприятия. Методы анализа и очистки : методические указания/ А. А. Шайхутдинова; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург : ОГУ, 2019.
3. Радченко Н. М., Шабунев А. А. Методы биоиндикации в оценке состояния окружающей среды: Учебно-методическое пособие. – Вологда: Издательский центр ВИРО, 2006. – 148 с.
4. Чеснокова, С. М. Биологические методы оценки качества объектов окружающей среды : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2. Методы биотестирования / С. М. Чеснокова, Н. В. Чугай ; Владим. гос. ун-т. – Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2008. – 92 с.
5. Свистова Ирина Дмитриевна Методические подходы к определению фитотоксической активности почвы и почвенных микроорганизмов // Лесотехнический журнал. 2019. №2 (34). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-opredeleniyu-fitotoksicheskoy-aktivnosti-pochvy-i-pochvennyh-mikroorganizmov> (дата обращения: 10.10.2022).

Описание методики определения флуктуирующей асимметрии

Сбор материала следует проводить после остановки роста листьев (в средней полосе начиная с июля). Каждая выборка должна включать в себя 100 листьев (по 10 листьев с 10 растений). Листья с одного растения лучше хранить отдельно, чтобы в дальнейшем можно было проанализировать полученные результаты индивидуально для каждой особи. Для этого рекомендуется собранные с одного дерева листья связывать за черешки. Все листья, собранные для одной выборки, сложить в полиэтиленовый пакет, туда же вложить этикетку с указанием номера выборки, места сбора (делая максимально подробную привязку к местности), даты сбора.

У березы повислой листья лучше собирать из нижней части кроны дерева с максимального количества доступных веток, относительно равномерно вокруг дерева, используются листья с укороченных побегов.

Материал может быть обработан сразу после сбора или позднее. Для непродолжительного хранения собранный материал можно держать в полиэтиленовом пакете на нижней полке холодильника.

Для оценки стабильности развития растений предпочтительным является учет асимметрии исследуемых структур, в норме являющихся симметричными. В качестве наиболее простой системы признаков, удобной для получения большого объема данных для различных популяций, предлагается система промеров листа у растений с билатерально симметричными листьями. Для оценки величины флуктуирующей асимметрии мы советуем выбирать признаки, характеризующие общие морфологические особенности листа, удобные для учета и дающие возможность однозначной оценки.

Для измерения лист помещают перед собой стороной, обращенной к верхушке побега. С каждого листа снимают показатели по пяти промерам с левой и правой сторон листа (см. рис. 1).

1–5 – промеры листа:

1 – ширина половинки листа (измерение проводить по середине листовой пластинки);

2 – длина второй от основания листа жилки второго порядка;

3 – расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка;

4 – расстояние между концами этих жилок;

5 – угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка




Рис. 1. Схема морфологических признаков
для оценки стабильности развития березы повислой (*Betula pendula*)

Для измерения лист складывают пополам, совмещая верхушку с основанием листовой пластинки. Потом разгибают лист и по образовавшейся складке производят измерения:

- ширины левой и правой половинок листа (в мм);
- длины жилки второго порядка, второй от основания листа;
- расстояния между основаниями первой и второй жилок второго порядка;
- расстояния между концами этих же жилок;
- угла между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка.

Для измерений потребуются измерительный циркуль, линейка и транспортир. Промеры 1–4 снимаются циркулем-измерителем, угол между жилками измеряется транспортиром [2,4,5].

Результаты определения флуктуирующей асимметрии

Таблица 2. Интегральный показатель флуктуирующей асимметрии у Березы повислой (парк «Нефтяник», г. Ярославль)

Номер листа	Номер признака					Величина асимметрии листа
	1-го	2-го	3-го	4-го	5-го	
1	-0,047619	0	0,07692308	0,04761905	0,01694915	0,018774446
2	0	0	0,11111111	0,03030303	0,01204819	0,030692467
3	0,01694915	0,02272727	0,16666667	0,03030303	0	0,047329224
4	0	0,03030303	0	0,04347826	0	0,014756258
5	0,04545455	0,01265823	0,09090909	0,09090909	0	0,047986191
6	0,03448276	0,03370787	0,07692308	0,07142857	0	0,043308454
7	0,02439024	0,01492537	0,11111111	0,08333333	0,02564103	0,051880217
8	0,05555556	0,01538462	0	0,04761905	0,02631579	0,028975002
9	0,06976744	0,02941176	0	0,11111111	0,02564103	0,047186269
10	0,05263158	0	0,33333333	0,04761905	0,03896104	0,094509
11	0	0,01639344	0,14285714	0,05263158	0,03797468	0,04997137
12	0,04166667	0,01265823	0	0,08333333	0,04347826	0,036227298
13	0,01960784	0,02380952	0,05263158	0,03030303	0,03030303	0,031331001
14	0,01960784	0,01176471	0,07692308	0,11111111	0,02564103	0,049009553
15	0,04347826	0,01449275	0,25	0,09090909	0,02325581	0,084427184
16	0,01886792	0	0,14285714	0,17647059	0	0,067639131
17	0,05882353	0,03448276	0,33333333	0,14285714	0,01265823	0,116430998
18	0,07692308	0,02941176	0	0,05882353	0,03092784	0,039217241
19	0,05555556	0,04	0,2	0,04761905	0,01265823	0,071166566
20	0,02439024	0	0,25	0	0,01960784	0,058799617
21	0,09090909	0,02941176	0,25	0,04761905	0,03614458	0,090816896
22	0,07407407	0,03370787	0,14285714	0,11111111	0,04109589	0,080569217
23	0,04545455	0,04477612	0,25	0,04761905	0,02272727	0,082115397
24	0,03448276	0,02564103	0,09090909	0,08333333	0	0,046873242
25	0,02040816	0,025	0,11111111	0,07142857	0,04109589	0,053808747
26	0,09090909	0,02272727	0,25	0,13043478	0,04477612	0,107769453
27	0	0	0,09090909	0,09090909	0,86046512	0,20845666
28	0,05	0	0,07692308	0,04761905	0,02564103	0,04003663
29	0,02325581	0,03225806	0	0	0,06060606	0,023223988
30	0	0,05	0,11111111	0,15789474	0,03614458	0,071030085
31	0,04	0,02439024	0,125	0,08333333	0,02439024	0,059422764
32	0,02439024	0,03225806	0,25	0,06666667	0,01010101	0,076683197
33	0,06976744	0,05084746	0,2	0,2	0,02272727	0,108668434

34	0,05	0,03030303	0,09090909	0,11111111	0,04109589	0,064683825
35	0,05555556	0,03333333	0,16666667	0,14285714	0,02439024	0,084560588
36	0,05882353	0,03846154	0,14285714	0,05263158	0	0,058554758
37	0,04545455	0	0,25	0,14285714	0,03614458	0,094891253
38	0,1	0,04477612	0,4	0,17647059	0,01234568	0,146718477
39	0,04545455	0,01449275	0,33333333	0,09090909	0,03797468	0,104432881
40	0,11111111	0,01886792	0,13043478	0,04761905	0,02941176	0,067488926
41	0,05555556	0,04	0,2	0,125	0,02564103	0,089239316
42	0,06976744	0,03225806	0,14285714	0,05263158	0,01204819	0,061912484
43	0,05882353	0,03225806	0,14285714	0,14285714	0,03225806	0,081810789
44	0,02040816	0,025	0,05882353	0,11111111	0,02439024	0,04794661
45	0,11111111	0,09090909	0,14285714	0,09090909	0,01265823	0,089688933
46	0,05555556	0,03448276	0	0,125	0,02439024	0,047885712
47	0,04545455	0,03333333	0,09090909	0,04347826	0,01234568	0,045104182
48	0,10344828	0,01754386	0,2	0,06666667	0,02564103	0,082659966
49	0	0,01369863	0,11111111	0,08333333	0,02040816	0,045710248
50	0,02702703	0,05263158	0,14285714	0,11111111	0,01234568	0,069194508
Значение стабильности флуктуирующей асимметрии у Березы повислой						0,067231513
						Город

Таблица 3. Интегральный показатель флуктуирующей асимметрии у Березы повислой (д. Ямищи, Ярославская обл.)

Номер листа	Номер признака					Величина асимметрии листа
	1-го	2-го	3-го	4-го	5-го	
1	0	0	0,11111111	0,08333333	0,01075269	0,041039427
2	0,01960784	0,01204819	0	0,09677419	0,01298701	0,028283448
3	0	0,01123596	0,06666667	0	0	0,015580524
4	0	0	0,06666667	0	0,01204819	0,015742972
5	0,0625	0	0	0	0	0,0125
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0,27777778	0,14285714	0,04761905	0,02439024	0,098528842
8	0,02857143	0	0,11111111	0,04347826	0	0,03663216
9	0,05882353	0,01587302	0	0	0,01538462	0,018016232
10	0	0	0	0,05263158	0	0,010526316
11	0	0,02439024	0,11111111	0	0,02040816	0,031181904
12	0,05	0	0,14285714	0,04761905	0,01265823	0,050626884
13	0	0	0	0	0,01818182	0,003636364
14	0,02439024	0	0,125	0	0,02040816	0,033959681
15	0,02222222	0	0,06666667	0	0	0,017777778
16	0	0,01694915	0	0	0,01098901	0,005587633
17	0,04347826	0,05454545	0	0,05263158	0,03614458	0,037359975
18	0	0,02222222	0	0,14285714	0	0,033015873
19	0,05882353	0	0,11111111	0	0,02702703	0,039392334

20	0,02564103	0,03846154	0	0	0,02325581	0,017471676
21	0,06666667	0,01639344	0,16666667	0,11111111	0	0,072167577
22	0	0,02222222	0	0	0	0,004444444
23	0,04	0	0	0,1	0,02439024	0,032878049
24	0,04347826	0	0,05263158	0,04347826	0	0,02791762
25	0,02564103	0,01538462	0	0	0,01204819	0,010614767
26	0,05882353	0	0	0,05882353	0	0,023529412
27	0	0	0	0	0,8125	0,1625
28	0,03448276	0	0	0,05263158	0	0,017422868
29	0,03030303	0	0,11111111	0	0,01234568	0,030751964
30	0,02702703	0	0	0,05263158	0	0,015931721
31	0	0,01960784	0,16666667	0,05882353	0	0,049019608
32	0	0,01587302	0	0	0	0,003174603
33	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0,16666667	0,02857143	0	0,039047619
35	0	0	0,25	0,11111111	0,02325581	0,076873385
36	0,04545455	0	0	0,02857143	0	0,014805195
37	0,02439024	0,0212766	0,2	0,04347826	0,01666667	0,061162353
38	0	0,01639344	0,14285714	0,04347826	0,01149425	0,04284462
39	0,02325581	0,02040816	0,28571429	0,15789474	0,03703704	0,104862007
40	0	0,04347826	0,07692308	0,04	0	0,032080268
41	0,03225806	0	0,06666667	0,09090909	0,00970874	0,039908512
42	0	0,02222222	0,14285714	0,16666667	0,01694915	0,069739037
43	0,02702703	0	0	0,05263158	0	0,015931721
44	0	0,03225806	0	0	0,01030928	0,008513469
45	0	0	0,09090909	0,06666667	0	0,031515152
46	0,03030303	0	0	0	0,03614458	0,013289522
47	0	0,01754386	0	0,05263158	0,02857143	0,019749373
48	0,01754386	0	0	0	0,01204819	0,00591841
49	0	0	0,33333333	0,09090909	0,0212766	0,089103804
50	0,05263158	0	0	0,1	0	0,030526316
Значение стабильности флуктуирующей асимметрии у Березы повислой						0,033861668
						Деревня

Описание методики (метод почвенных пластинок)

1. В чашки Петри поместить по 60 г почвы без корней и растительных остатков, увлажнить и растереть до состояния густой пасты, ровно размазать шпателем.

2. Семена предварительно замочить в течение суток. В чашки Петри посеять по 30 штук семян испытуемого растения. Семена должны быть мелкие без запаса питательных веществ, они лучше реагируют на изменения окружающей среды.

3. Семена проращивают в течение 3-9 дней при постоянной температуре и влажности, почву увлажняют равным количеством воды (5-10 мл).

4. При учете результатов измеряют длину проростков, корней, число проросших семян.

Степень фитотоксичности почв рассчитывают по изменению длины корешков и проростков тест-растения, выращенных на исследуемых почвах по отношению к контролю, выраженную процентах. Определяется фитотоксичность почв, биотест по корням (Ф_{пк}), по изменению длины трехдневных корешков и фито-токсичность почв, биотест по росткам (Ф_{пр}) по изменению длины шестидневных проростков, а также по средним данным измерений через три, шесть и девять дней [1] .

Результаты измерения показателей почвы и дождевой воды

Таблица 7. Показатели образцов почв

Параметр измерения	Почва парка «Нефтяник»	Почва из д. Ямищи, Ярославской обл.
Влажность	12,885%	23,415%
Количество органических веществ (гумуса)	12,015%	7,14%
рН почвенной вытяжки	6,16	7,11

Таблица 8. Некоторые параметры дождевой воды

Параметр измерения	Дождевая вода, взятая из д. Ямищи, Ярославская обл.	Дождевая вода, взятая из парка «Нефтяник», г. Ярославль
Водородный показатель (рН)	6,34	5,95
Жёсткость воды	0,1 мг-экв/л	0,2 мг-экв/л
Содержание хлорид-ионов (Cl ⁻)	0 мг/л	0,1 мг/л
Электропроводность	18,8 мкСм/см	64 мкСм/см

Содержание металлов в образцах почв

Диаграмма 1. Содержание лёгких металлов в деревенской почве




Диаграмма 2. Содержание тяжелых металлов в деревенской почве




Диаграмма 3. Содержание лёгких металлов в почве парка «Нефтяник»




Диаграмма 4. Содержание тяжёлых металлов в почве парка «Нефтяник»

